



GONORREIA

O QUE É

É uma infecção causada por uma bactéria que pode localizar-se na boca, pênis, vagina ou reto.

COMO SE MANIFESTA

A infecção por gonorreia na cavidade oral pode ser acompanhada de dor de garganta, mas na maioria dos casos não causa sintomas.

A infecção por gonorreia no pênis e vagina causa frequentemente o aparecimento de corrimento amarelo-esverdeado e ardor ao urinar. As pessoas com vagina podem sangrar entre menstruações.

Quando há infecção anal, raramente há sintomas, mas pode causar corrimento, comichão e desconforto/dor anal.

COMO SE TRANSMITE

A gonorreia transmite-se durante as relações sexuais com penetração oral, vaginal ou anal sem uso de preservativo (incluindo brinquedos sexuais).

A gonorreia pode ser transmitida através das mãos durante a relação sexual - ao tocarem numa parte infetada do corpo podem transportar a gonorreia para o corpo da outra pessoa.

COMO SE DIAGNOSTICA

O diagnóstico é realizado numa amostra de urina e de secreções de todas as mucosas envolvidas no sexo (oral, anal e vaginal), colhidas com cotonete.

COMO SE TRATA

O tratamento é realizado com antibióticos em comprimidos e injeção.

COMO SE PREVINE

O uso de preservativo pode impedir a transmissão da infeção por gonorreia.

O rastreio de gonorreia nas pessoas sexualmente mais ativas sem sintomas deve ser realizado anualmente. Em casos de risco acrescido, a cada 3 meses.

Os/as parceiros/as de pessoas diagnosticadas com gonorreia devem realizar o rastreio da infeção.

Abster-se de relações sexuais até 7 dias após início do antibiótico é importante para impedir a transmissão da infeção.

Promotor



Parceiros



Financiadores

