

AVALIA O QUE SABES SOBRE A INFEÇÃO AGUDA POR VIH

A FASE IMEDIATAMENTE APÓS A INFEÇÃO

1. Que percentagem de pessoas com infeção aguda pelo VIH apresenta sintomas?

- A) 0%-24%
- B) 25%-49%
- C) 50%-90%
- D) 91%-100%

2. Quanto tempo, após o início da infeção, ocorrem geralmente os sintomas?

- A) 1 dia
- B) 3 dias
- C) 1 semana
- D) 2-4 semanas

3. Geralmente, quanto tempo duram os sintomas?

- A) 1 dia
- B) 3 dias
- C) 1 semana
- D) 2-4 semanas

4. Quais dos seguintes sintomas podem aparecer? (escolhe todos os que se aplicarem)

- A) Febre
- B) Fadiga
- C) Dor muscular e articular
- D) Dor de cabeça
- E) Gânglios inchados
- F) Manchas na pele da parte superior do corpo
- G) Podem não ter nenhum
- H) Todas as anteriores

5. Quanto tempo depois da exposição se pode detetar a maioria das infeções por VIH quando usamos um teste que procura anticorpos (defesas)?

- A) 1-2 semanas
- B) 2-4 semanas
- C) 4-6 semanas
- D) 6-8 semanas

6. Quanto tempo depois da exposição se pode detetar a maioria das infeções por VIH quando usamos um teste que procura o próprio vírus?

- A) 1-2 semanas
- B) 2-4 semanas
- C) 4-6 semanas
- D) 6-8 semanas

7. Qual é o risco de transmissão do vírus na fase aguda da infeção pelo VIH?

- A) Nenhum
- B) Baixo
- C) Alto
- D) Muito alto

Durante a primeira fase da infeção, o VIH multiplica-se a uma elevada velocidade. Ao contrário de outros vírus, o VIH não pode ser eliminado pelo nosso sistema imunitário. Esta fase inicial da infeção dura até o nosso corpo ter criado anticorpos. Até termos criado anticorpos os sintomas aparecem na maioria das pessoas.

Os sintomas são parecidos com uma gripe (ou outra virose), por isso a maioria das pessoas não suspeita que possa estar infetada. Esta fase é caracterizada por elevadas quantidades de VIH no sangue, esperma e muco retal, o que aumenta o risco de transmissão em 100 a 1000 vezes, comparativamente com as restantes fases da infeção.

Contudo, uma pessoa diagnosticada com VIH, em tratamento eficaz há mais de 6 meses, não transmite VIH por via sexual.

Assim, quando acontece sexo anal sem preservativo (sem estar sob PrEP) nas últimas 6 semanas e há sintomas, ou um parceiro foi diagnosticado com VIH recentemente, está recomendado fazer o teste a VIH - a deteção e tratamento precoces permitem parar as transmissões por via sexual.

Existem 2 tipos de teste capazes de detetar a infeção pelo VIH nesta fase:

1. **Os testes moleculares**, que detetam vírus no sangue a partir do 7º dia após a infeção;
2. **Os testes de 4ª geração**, que detetam o antigénio do vírus no sangue a partir do 14º dia após a infeção.



📍 Travessa Monte do Carmo, 2, 1200-277 Lisboa

☎ +351 910 693 158 (apenas para marcações)

✉ geral@checkpointlx.com / consulta.ist@checkpointlx.com

🌐 checkpointlx.com / f CheckpointLX

🕒 Segunda a sexta das 12 às 20h

(A admissão para realização do teste termina 60m antes da hora de encerramento)

Promotor



Parceiros



Financiadores

